

## 1.2.5. Imprägnierte Ameisensäure-Streifen (MAQS®)

### **Besonderes:**

Registriertes, gebrauchsfertiges Tierarzneimittel zur einfachen Anwendung in Wirtschaftsvölkern.

Achtung: Gefahr von erhöhter Sterblichkeit von Bienen, Brut und Königinnen, besonders zu Beginn der Behandlung.

Weichen die Ergebnisse von der Packungsbeilage ab, erstatten Sie bitte Meldung bei Swissmedic: [www.vetvigilance.ch/meldungen.html](http://www.vetvigilance.ch/meldungen.html)

### **Schutzmassnahmen:**

Die imprägnierten Streifen sind mit Ameisensäure getränkt, welche auch in nicht flüssiger Form stark ätzend ist. Der Umgang mit ihr erfordert grosse Vorsicht. In jedem Fall sind säurefeste Gummihandschuhe, Schutzbrille und langärmelige Kleidung zu tragen. Nur im Freien öffnen und die Dämpfe nicht einatmen.

### **Benötigtes Material:**

- MAQS® Beehive strips ad us. vet (Andermatt BioVet AG)
- Säurefeste Handschuhe und Schutzbrille
- Schere (zum Öffnen der Aussenverpackung mit den zwei Streifen)
- Gittergeschützte Varroa-Windel für den Schweizerkasten
- Kessel mit Wasser (zum raschen Wegwaschen allfälliger Säurerückstände)

### **Wichtige Punkte:**

- Erste Behandlung vor Ende Juli (nach der Honigernte), zweite Behandlung spätestens Mitte September beginnen.
- Beim Schweizerkasten keinen Trommelraum geben.
- Verpackung der einzelnen Streifen nicht beschädigen oder zerschneiden.

- Streifen am besten frühmorgens, wenn es noch kühl ist, in die Völker geben.
- Für einzargige Magazine oder Schweizerkasten mit mindestens 6 vollbesetzten Brutwaben (entspricht einem Wirtschaftsvolk mit ca. 10'000 Bienen).
- Anders als in der Packungsbeilage angegeben, nicht während der Zwischentracht verwenden, da dies Rückstände im Sommerhonig nach sich zieht (siehe [Empfehlungsliste Imkerei-Präparate](#)).
- Völker müssen bei Behandlung offenes Futter zur Verfügung haben.
- Während der Behandlung nicht füttern und Völker nicht stören.


### Vorgehen:

- Schutzkleidung/-brille anziehen
- Fluglöcher maximal öffnen
- Produkt gemäss [Packungsbeilage](#) verwenden. Die Anwendungshinweise sind unbedingt einzuhalten.
- Imprägnierte Streifen direkt auf Wabenschenkel legen. Beim Schweizerkasten keinen Trommelraum geben und mit Deckbrettchen abdecken.
- Bei Temperaturen gegen 30°C, Gitterboden im Magazin öffnen.

### Magazin


Dadant

☞ für andere Magazintypen, siehe Packungsbeilage



### Schweizerkasten

kein Trommelraum



\*Streifen

Link zur MAQS-Packungsbeilage:

[www.vetpharm.uzh.ch/tak/06000000/00065296.01](http://www.vetpharm.uzh.ch/tak/06000000/00065296.01)

Link zu Flyer BioVet

[www.biovet.ch/media/downloads/1033/Flyer\\_MAQS\\_de.pdf](http://www.biovet.ch/media/downloads/1033/Flyer_MAQS_de.pdf)